

Reabilitação funcional e estética: retratamento endodôntico e restauração semidireta em pré-molar superior

Functional and esthetic rehabilitation: endodontic retreatment and semidirect restoration of a maxillary premolar

Amanda Silva Mouta[1]; Antônio Carlos Lino Ribeiro[1]; Flávia Maria Falcão de Araújo[1]; Andressa Souza da Silva[2]; Márcio Lopes Linhares[3]; Lara Pepita de Souza Oliveira[3]

[1] Acadêmicos de Odontologia da Faculdade do Amazonas (IAES), Manaus, Amazonas, Brasil.
[2] Especialista em Dentística da Faculdade do Amazonas (IAES), Manaus, Amazonas, Brasil.
[3] Docentes de Odontologia da Faculdade do Amazonas (IAES), Manaus, Amazonas, Brasil.

Introdução: A reabilitação de dentes tratados endodonticamente com extensa destruição coronária exige planejamento integrado e preservação da estrutura remanescente. Nesse contexto, a técnica semidireta em resina composta constitui uma alternativa restauradora que permite a confecção extraoral da restauração e sua posterior cimentação adesiva. **Objetivo:** Apresentar um caso clínico de reabilitação em primeiro pré-molar superior com comprometimento coronário acentuado, mediante retratamento endodôntico e restauração semidireta em resina composta. **Relato de caso:** Paciente do sexo feminino, 50 anos,foi encaminhada para o projeto de extensão Resgatando Sorrisos, da Faculdade do Amazonas (IAES) com a queixa de extensa destruição coronária do elemento 14 e exposição do canal radicular ao meio bucal por aproximadamente cinco anos, segundo seu relato. A avaliação clínica e radiográfica evidenciou perda estrutural significativa e acentuado espessamento do espaço do ligamento periodontal. Identificou-se também pneumatização do seio maxilar, considerada no planejamento pela proximidade anatômica com o elemento. Diante do tratamento endodôntico prévio e do período prolongado de exposição, realizou-se retratamento endodôntico em duas sessões, com remoção do material obturador preexistente e utilização de medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio (UltraCal CX). Após a obturação dos canais radiculares, procedeu-se à reconstrução do remanescente mediante confecção de biobase associada à férula interna. Posteriormente, confeccionou-se uma restauração semidireta em resina composta sobre modelo de gesso, seguida de cimentação adesiva. Ao término do tratamento, foram restabelecidas a anatomia, a estética e a função do dente. **Considerações finais:** A associação entre retratamento endodôntico, reconstrução do remanescente e restauração semidireta possibilitou a reabilitação do elemento dentário, o caso destaca a importância do planejamento integrado entre endodontia e dentística na abordagem de dentes com perda estrutural acentuada e comprometimento pulpar. O acompanhamento clínico e radiográfico é necessário para avaliar a resposta dos tecidos periapicais e a manutenção dos resultados restauradores.

Palavras-chave: retratamento endodôntico; estética dentária; reabilitação bucal; restauração dentária permanente.

Eixo Temático: Dentística.

Revista Clínica de Odontologia (RCO)
Faculdade do Amazonas – IAES
ISSN-e: 2966-4128
DOI: https://doi.org/10.70614/hs1zp139