

Restauração semidireta em dente posterior associada a aumento gengival após aumento de coroa clínica

Semi-direct restoration in a posterior tooth associated with gingival enlargement following crown lengthening

Leonardo Carvalho de Oliveira[1]; Sérgio Souza de Macedo Filho[1]; Andressa Souza da Silva[2]; Luciana Aleixo dos Santos de Melo[3]; Lara Pepita de Souza Oliveira[3]

[1] Acadêmicos de Odontologia da Faculdade do Amazonas (IAES), Manaus – AM, Brasil.
[2] Especialista em Dentística pela Faculdade do Amazonas (IAES), Manaus – AM, Brasil.
[3] Docentes de Odontologia da Faculdade do Amazonas (IAES), Manaus – AM, Brasil.

Introdução: A técnica semidireta propicia a reabilitação em situações nas quais a destruição coronária compromete a anatomia, a função e a resistência. Essa abordagem permite a confecção extraoral da restauração em resina composta, favorecendo a reprodução da anatomia oclusal e o controle dos contornos restauradores. Entretanto, a escolha da técnica deve considerar a quantidade de remanescente dental, a localização das margens cavitárias e condições de isolamento. **Objetivo:** Apresentar um caso de reabilitação de um dente posterior com extensa destruição coronária com restauração semidireta, destacando o manejo do crescimento gengival após aumento de coroa clínica. **Relato de caso:** Paciente do gênero feminino, 27 anos, apresentou-se no projeto de extensão Resgatando Sorrisos da Faculdade do Amazonas (IAES), com um dente posterior (26) acometido por comprometimento estrutural extenso. Após avaliação, foram indicados aumento de coroa clínica e restauração semidireta. Constatada a margem subgengival, foi encaminhada para cirurgia periodontal de aumento de coroa clínica. Em virtude de imprevistos, a paciente só retornou após três semanas. Com isso, com o dente sem provisório, houve um crescimento gengival que dificultava a visualização do término cervical novamente. Portanto, realizou-se uma gengivoplastia e iniciou-se a confecção da biobase com utilização de resina Flow e convencional. A restauração semidireta foi confeccionada com resina composta Forma na cor A2B. Após prova clínica e ajustes, realizou-se cimentação, acabamento e polimento. **Considerações finais:** O caso evidenciou a importância da integração entre os procedimentos periodontais e restauradores na reabilitação com restaurações semidiretas. O acompanhamento da resposta gengival e a adequação do planejamento diante de alterações teciduais são necessários para a conclusão do tratamento e ressaltaram a relevância do controle periodontal e dos intervalos entre as etapas clínicas.

Palavras-chave: resinas compostas; tratamento endodôntico; restauração dentária; biomimética.

Eixo Temático: Dentística.

Revista Clínica de Odontologia (RCO)
Faculdade do Amazonas – IAES
ISSN-e: 2966-4128
DOI: https://doi.org/10.70614/hxmn0n09