

Mascaramento de dentes escurecidos com facetas em resina composta: uso do opacificador e resinas para dentes clareados

Masking discolored teeth with composite resin veneers: use of an opaquer and bleach-shade composite resins

Maria Eduarda Ribeiro Loureiro[1]; Aline Sevalho Samias[1]; Gabriely Soares Gomes de Oliveira[2]; Maria Lilian Andrade Rodrigues[2]; Márcio Lopes Linhares[3]; Lara Pepita de Souza Oliveira[3]

[1] Acadêmicas de Odontologia da Faculdade do Amazonas (IAES), Manaus, Amazonas, Brasil.
[2] Especialistas em Dentística da Faculdade do Amazonas (IAES), Manaus, Amazonas, Brasil.
[3] Docentes de Odontologia da Faculdade do Amazonas (IAES), Manaus, Amazonas, Brasil.

Introdução: As facetas diretas em resina composta permitem corrigir alterações de cor, forma e proporção dos dentes anteriores. Em substratos escurecidos, o resultado estético depende do controle da opacidade, da espessura e da estratificação dos materiais. **Objetivo:** Relatar um caso de reabilitação estética de dentes anterossuperiores escurecidos, com coroas clínicas curtas e diastemas, utilizando facetas diretas em resina composta para mascaramento, fechamento dos diastemas e aumento incisal**. Relato de caso:** Paciente do sexo feminino, 56 anos, foi encaminhada ao projeto de extensão Resgatando Sorrisos, da Faculdade do Amazonas (IAES), insatisfeita com a cor, o comprimento e o espaçamento dos dentes anterossuperiores. Após avaliação clínica e radiográfica e resolução das necessidades restauradoras e endodônticas, iniciou-se a reabilitação estética. O elemento 12, com escurecimento mais acentuado, recebeu opacificador fluido (Assist Opaquer, cor Universal; FGM), visando reduzir a influência cromática do substrato. Os aumentos incisais foram realizados com auxílio da matriz BRB, confeccionada em silicone de condensação, orientando a reconstrução das paredes palatinas. Em seguida, confeccionaram-se as paredes proximais para fechamento dos diastemas e definição dos contornos. A estratificação associou resinas de esmalte e dentina Vittra (FGM), resinas Estelite Bianco W1, Palfique WE (Tokuyama) e resina Elora WE (FGM), buscando equilíbrio entre mascaramento, luminosidade e translucidez. A abordagem favoreceu a harmonização cromática e o equilíbrio das proporções dentárias. No acompanhamento, foram realizados ajustes estéticos adicionais para manutenção do resultado, considerando o histórico de dieta rica em pigmentos. **Considerações finais:** O planejamento individualizado e a avaliação multidisciplinar permitem integrar o manejo das alterações de cor, forma e tamanho às necessidades do paciente. O acabamento e o polimento favorecem a lisura superficial e a saúde periodontal. O acompanhamento clínico é essencial para avaliar a estabilidade dos resultados e identificar necessidades de manutenção.

Palavras-chave: facetas dentárias; resinas compostas; diastema; estética dentária.

Eixo Temático: Dentística.

Revista Clínica de Odontologia (RCO)
Faculdade do Amazonas – IAES
ISSN-e: 2966-4128
DOI: https://doi.org/10.70614/ga20sh96